

UROCULTIVO

Tener por lo menos tres horas de retención, lo ideal es hacer la recolección con la primera orina de la mañana. Previa higiene con abundante agua y jabón neutro; (en caso de no orinar al momento repetir la higiene cada media hora).

Mujeres: colocar previamente a la recolección un tampón vaginal (retirar después de orinar).

Hombres: debe retraer el prepucio al higienizarse y orinar.

Bebes (con pañales): el método ideal “es al acecho” o sea quitar el pañal al bebe, higienizar la zona, abrir el frasco en el momento de recolectar la orina. (Higienizar cada media hora de ser necesario).

Toma de muestra: Al comenzar a orinar desechar el primer chorro, tras lo cual y sin interrumpir la micción, se recogerá el chorro medio de la orina en el recipiente y el final de la micción se descartara. El frasco debe sujetarse para que no tome contacto con las piernas, zona genital o ropa del paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o superficie interior. Terminada la recolección cerrar el frasco y colocarlo en heladera hasta remitir al laboratorio dentro de las 2 hs.

SI ESTA RECIBIENDO TRATAMIENTO ANTIBIOTICO, UNA VEZ FINALIZADO EL MISMO, DEJAR PASAR 72HS PARA TOMAR LA MUESTRA
POR FAVOR CUMPLA CON ESTAS INSTRUCCIONES. **LA CALIDAD ES NUESTRO OBJETIVO**

Laboratorio Brandsen S.R.L
Brandsen 1670 PB. Capital Federal
Tel: 4301-1007 / 4302-6734